



Regione Umbria

Servizio Fitosanitario Regionale

Bollettino Fitosanitario VITE n. 9 del 24/06/2019

PERUGIA E TERNI

Fase fenologica:

Fine Fioritura, Sviluppo acini (BBCH 68- BBCH 75).

PERONOSPORA

Segnalazione di presenza di sintomi di peronospora (dati provenienti da progetto SMART METEO) nei Comuni indicati nel precedente Bollettino N. 8 del 17.06.

In presenza di prolungate bagnature si consiglia di intervenire con prodotti rameici o altre s.a. quali ametoctradina, zoxamide in grado di assicurare una maggiore copertura del grappolo in condizioni di maggiore inoculo del micete in funzione della persistenza delle s.a. utilizzate nel precedente trattamento fitosanitario.

OIDIO

Si consiglia di abbinare al trattamento antiperonosporico Zolfi bagnabili, Bupirimate, IBE, Metrafenone, Cyflufenamide, Spiroxamina ecc.... assicurando una copertura continua in funzione della persistenza del prodotto fitosanitario precedentemente utilizzato oppure intervenire con zolfo in polvere.

Tignoletta della vite (*Lobesia botrana*)

Fase crescente del volo della 1 generazione carpofiga a Magione. Eventuali interventi da effettuarsi al superamento della soglia riportata nel disciplinare di difesa integrata valido per l'anno in corso.

Le s.a. utilizzabili sono riportate nel relativo disciplinare di difesa integrata della Regione Umbria valido per l'annata 2018-2019.

Tutti i bollettini fitosanitari relativi alla difesa della vite sono scaricabili dal sito della Regione Umbria al seguente indirizzo: <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/bollettini-fitosanitari>

I bollettini fitosanitari per la coltura della vite vengono redatti sulla base dei Disciplinari di Difesa Integrata 2018/2019, scaricabili dal sito della Regione Umbria al seguente indirizzo:

<http://www.regione.umbria.it/agricoltura/disciplinari-di-produzione-integrata>