Bollettino fitosanitario olivo n.2
del 21 luglio 2016

Fase fenologica:
inizio ingrossamento frutti (BBCH:71) – inizio indurimento nocciolo (BBCH: 75)

Sulla base dei dati pervenuti ad oggi, da parte dei tecnici delle organizzazioni APROL ASSOPROL e OPOO, si riscontrano catture di adulti nelle trappole a feromone installate a livello regionale nei seguenti Comuni:

Amelia, Arrone, Assisi, Bettona, Castel Ritaldi, Castiglione del Lago, Città della Pieve, Corciano, Deruta, Foligno, Giano dell'Umbria, Gubbio, Gualdo Cattaneo, Gualdo Tadino, Lugnano in Teverina, Magione, Montefalco, Monteleone di Orvieto, Orvieto, Paciano, Panicale, Perugia, Passignano sul Trasimeno, Piegaro, Spello, Spoleto, Terni, Todi, Torgiano, Trevi, Tuoro, Umbertide.

Le aziende che praticano la difesa preventiva adulticida devono prevedere un trattamento, con s.a. Spinosad (max 8 applicazioni /stagione) per ridurre la popolazione presente, o utilizzare trappole innescate con feromone e impregnate con insetticida (autorizzati per la mosca dell'olivo).

Per la difesa curativa (nei confronti delle larve) si ricorda che le drupe sono suscettibili solo all'indurimento del nocciolo e i trattamenti vanno effettuati non prima del superamento della soglia di intervento dall'8 al 10% di infestazione attiva (uova e larve vive) riscontata su un campione di 100 drupe.

Non si consigliano interventi all'attualità

Sono in via di istallazione altre stazioni di monitoraggio.

L'Ispettore fitosanitario
(Dr.ssa Eliana Consolani)

Il Dirigente del Servizio Innovazione, promozione, irrigazione, zootecnia e fitosanitario

Dott. Giuliano Polenzani

http://www.cfumbria.it/