Bollettino fitosanitario olivo n.1
del 5 luglio 2016

Fase fenologica: allegagione (BBCH:69) – inizio ingrossamento frutti (BBCH:71)

Per il 2016 in applicazione del punto A.7 del PAN "difesa fitosanitaria a basso impatto" la Regione dell'Umbria predisporrà bollettini di difesa per la mosca dell'olivo (*Bactrocera oleae)* in collaborazione con le Organizzazioni dei produttori : Aprol – Assoprol - OPOO
Saranno collocate trappole a feromone nei seguenti Comuni:
Amelia, Arrone, Assisi, Bettona, Castel Ritaldi, Castiglione del Lago, Città della Pieve, Corciano, Deruta, Foligno, Giano dell'Umbria, Gubbio, Gualdo Cattaneo, Gualdo Tadino, Lugnano in Teverina, Magione, Montefalco, Monteleone di Orvieto, Orvieto, Panicale, Perugia, Passignano sul Trasimeno, Piegaro, Spello, Spoleto, Terni, Todi, Torgiano, Trevi, Tuoro, Umbertide.

Si ricorda che i metodi di difesa fitosanitaria nei confronti della *Bactrocera oleae* possono essere di due tipi:
Difesa preventiva (adulticida): con esche proteiche avvelenate intervenendo alle primissime infestazioni o applicando il metodo " Attract and Kill" utilizzando trappole innescate con feromone e impregnate con insetticida.

Difesa curativa (nei confronti delle larve): con insetticidi autorizzati su olivo per la mosca, non prima del superamento della soglia di intervento dall'8 al 10% di infestazione attiva (uova e larve vive) riscontata su un campione di 100 drupe, al raggiungimento della fase fenologica di indurimento del nocciolo.

Si ricorda che temperature superiori a 30° determinano una marcata riduzione della fertilità delle femmine della mosca e una elevata mortalità delle uova e delle larve di I età.

L'Ispettore fitosanitario
(Dr.ssa Claudia Santinelli)

Il Dirigente del Servizio Innovazione, promozione, irrigazione, zootecnia e fitosanitario

Dott. Giuliano Polenzani