

DIFESA GUIDATA VITE
BOLLETTINO FITOSANITARIO N.3 DEL 03/05/2016
PERUGIA E TERNI

Fase fenologica : Grappoli visibili , Grappoli separati

PERONOSPORA


Possibile evasione dell'infezione primaria del 23.04 a metà settimana

In previsione di possibili piogge a fine settimana si consiglia di mantenere la copertura antiperonosporica con prodotti endoterapici quali cymoxanil, CAA (mandipropamide, dimetomorph, valiphenalate, benthiovalicarb, iprovalicarb) , Fenilammidi (metalaxil, metalaxil-m. benalaxil, benalaxil-M), Fluopicolide, associati a prodotti di copertura .Nel caso di eventuale comparsa di sintomi di peronospora avvisare tempestivamente il Servizio fitosanitario regionale ai seguenti Numeri telefonici: 075-5046261, 5046262.

OIDIO

Abbinare al trattamento antiperonosporico zolfi bagnabili, meptildinocap, spiroxamina, IBE ecc..

**L' Ispettore fitosanitario
(Dr Giovanni Natalini)**



Regione Umbria

Servizio Innovazione , promozione, Irrigazione, zootecnia e fitosanitario

Il Dirigente

(Dr Giuliano Polenzani)

