

DIFESA GUIDATA VITE  
BOLLETTINO FITOSANITARIO N.10 DEL 05/07/2016  
PERUGIA E TERNI

Fase fenologica : Ingrossamento acini

**PERONOSPORA**

Si consiglia di assicurare la copertura antiperonosporica con prodotti quali CAA ( mandipropamide, dimetomorph, valiphenalate, benthiovalicarb, iprovalicarb) , cymoxanil, ametoctradina, amisulbrom, cyazofamide, zoxamide ecc..., privilegiando il rame come partner .

Si informa che il disciplinare difesa integrata vite per l'anno 2015-2016 è stato pubblicato sul Suppl. ordinario n. 8 al BUR n. 26 del 01.06.2016 e risulta reperibile sul sito della Regione Umbria:

[www.regione.umbria.it/agricoltura/difesa-integrata](http://www.regione.umbria.it/agricoltura/difesa-integrata)

**OIDIO**

Abbinare al trattamento antiperonosporico zolfi bagnabili, spiroxamina, IBE , Quinoxifen, Cyflufenamide , Bupirimate, ecc.. oppure effettuare trattamenti polverulenti con zolfo.

**Tignoletta vite**

Fase crescente del volo della 1 generazione carpofoaga. Eventuali interventi al superamento della soglia di intervento pari al 10-15% di grappoli con uova e/o larve. I prodotti fitosanitari impiegabili sono riportati nel disciplinare di difesa integrata valido per l' anno 2016.

**Botrite**

Su cultivars precoci a grappolo compatto ed in zone recettive sono possibili interventi in pre-chiusura grappolo con antibotritici specifici riportati nel relativo disciplinare di produzione integrata

L' Ispettore fitosanitario

( Dr Giovanni Natalini)

Regione Umbria

Servizio Innovazione , promozione, Irrigazione, zootecnia e fitosanitario

Il Dirigente

( Dr Giuliano Polenzani)