

DIFESA GUIDATA VITE
BOLLETTINO FITOSANITARIO N.2 DEL 26/04/2016
PERUGIA E TERNI

Fase fenologica :

Cv precoci (Chardonnay, Grechetto, Sangiovese ecc..) : Grappoli visibili

Cv tardive (Trebbiano ecc): lunghezza germogli 10cm , grappoli differenziati

PERONOSPORA

In previsione di possibili piogge a metà settimana si consiglia di mantenere la copertura antiperonosporica con prodotti endoterapici quali cymoxanil, CAA (mandipropamide, dimetomorph, valiphenalate, benthiovalicarb, iprovalicarb), Fenilammidi (metalaxil, metalaxil-m. benalaxil, benalaxil-M), Fluopicolide, associati a prodotti di copertura .Nel caso di eventuale comparsa di sintomi di peronospora avvisare tempestivamente il Servizio fitosanitario regionale ai seguenti Numeri telefonici: 075-5046261, 5046262.

OIDIO

Abbinare al trattamento antiperonosporico zolfi bagnabili, meptildinocap, spiroxamina, IBE ecc..

Marciume nero

Dove sono stati riscontrati nell'anno passato attacchi di marciume nero (Montefalco, Baschi) privilegiare le s.a. utilizzabili per il controllo di peronospora (Mancozeb, Metiram) e Oidio (Difenconazolo, Fenbuconazolo, Miclobutanil, Tetraconazolo) in quanto efficaci.

L' Ispettore fitosanitario
(Dr Giovanni Natalini)



Regione Umbria

Servizio Politiche per l'innovazione , la promozione e fitosanitarie

Il Dirigente vicario,

(Dr Augusto Buldrini)

