

DIFESA GUIDATA VITE
BOLLETTINO FITOSANITARIO N.8 DEL 17/06/2016
PERUGIA E TERNI

Fase fenologica : Fine Fioritura, Allegagione, Ingrossamento acini

PERONOSPORA

Presenza diffusa di peronospora nei testimoni presenti a Fabbri di Montefalco, Torgiano (PG) e Alleroni (TR).

Stante l' incerto andamento climatico, si consiglia di assicurare la copertura antiperonosporica con prodotti quali CAA (mandipropamide, dimetomorph, valiphenalate, benthiovalicarb, iprovalicarb) , cymoxanil, ametoctadina, amisulbrom, cyazofamide ecc..., privilegiando il rame come partner dove è avvenuta l'allegagione, al fine di scongiurare manifestazioni di peronospora larvata su grappolo.

Si informa che il disciplinare difesa integrata vite per l'anno 2015-2016 è stato pubblicato sul Suppl. ordinario n. 8 al BUR n. 26 del 01.06.2016 e risulta reperibile sul sito della Regione Umbria:

www.regione.umbria.it/agricoltura/difesa-integrata

OIDIO

Abbinare al trattamento antiperonosporico zolfi bagnabili, spiroxamina, IBE , Quinoxifen, Cyflufenamide , Bupirimate, ecc..

Tignoletta della vite (*Lobesia botrana*)

Presenza di adulti nelle trappole. Inizio volo della 1 generazione carpofaga.

L' Ispettore fitosanitario
(Dr Giovanni Natalini)

Regione Umbria

Servizio Innovazione , promozione, Irrigazione, zootecnia e
fitosanitario

Il Dirigente
(~~Dr Giuliano Polenzani~~)