

DIFESA GUIDATA VITE

BOLLETTINO FITOSANITARIO N.3 DEL 03.05.017- PERUGIA E TERNI

Fase fenologica :Cv precoci (Chardonnay, Grechetto, Sangiovese ecc..) :
lunghezza germogli (BBCH 53-55-57)
Cv tardive(Trebbiano ecc): lunghezza germogli 10-15cm (BBCH 13-14-53)

PERONOSPORA

Possibile ulteriore infezione primaria verificatasi in data 28.04.2017 su tutto il territorio regionale.

In previsione di possibili piogge si consiglia di assicurare la copertura antiperonosporica, laddove la vegetazione ha superato i 10 cm, con prodotti endoterapici quali cymoxanil, CAA (mandipropamide, dimetomorph, valiphenalate, benthiovalicarb, iprovalicarb) , Fenilammidi (metalaxil, metalaxil-m. benalaxil, benalaxil-M), Fluopicolide, associati a prodotti di copertura .

OIDIO

Abbinare al trattamento antiperonosporico zolfi bagnabili, meptildinocap, spiroxamina, IBE.

L' Ispettore fitosanitario
(Dr Giovanni Natalini)

Regione Umbria
Servizio Innovazione, Promozione, Irrigazione, Zootecnia e Fitosanitario
(~~Dr Giuliano Polenzani~~)