

## Bollettino fitosanitario olivo n. 9 del 08.09.2016

### Difesa mosca olivo (*Bactrocera oleae*) e occhio di pavone (*Spilocea oleaginea*)

#### Fase fenologica: Fine ingrossamento drupe (BBH79)

Le aziende che praticano la difesa preventiva adulticida proseguiranno con l'utilizzo di esche adulticide contenenti la s.a. spinosad ( al massimo 8 interventi/stagione) per ridurre la popolazione presente (persistenza 7-10gg; ripetere in caso di pioggia), o potranno utilizzare trappole innescate con feromone e impregnate con insetticida – attract and Kill-( registrate per la mosca dell'olivo).

Per le aziende che applicano la difesa curativa ( nei confronti delle larve) i trattamenti vanno effettuati al superamento della soglia di intervento variabile dal 8% al 10 % di infestazione attiva ( uova e larve ).

Sulla base dei dati pervenuti ad oggi, da parte dei tecnici delle Organizzazioni APROL, ASSOPROL e OPOO si registrano infestazioni di mosca dell'olivo (*Bactrocera oleae*) a macchia di leopardo sul territorio regionale in funzione dei fattori predisponenti gli attacchi ( varietà, esposizione, turgidità drupe ecc... ) .

In particolare in base ai rilievi effettuati si riscontra quanto segue:

#### ZONA DOP – COLLI AMERINI

Comune	Infest. Attiva <5%	Infest. Attiva 5 – 7 %	Infest. Attiva > 8% =	Uova	Larve I	Larve II III	Trattato
Amelia Porchiano	3				1	2	
Amelia Porchiano	1			1			
Amelia Fornole		6		1	3	2	
Amelia Montecampano		6		5	1		
Lugnano	3			1	1	1	

Lugnano			8	1	2	5	
Narni Podernovo				0	0	0	

## ZONA DOP – COLLI ASSISI SPOLETO

Comune	Infest. Attiva <5%	Infest. Attiva 5 – 7 %	Infest. Attiva > 8% =	Uova	Larve I	Larve II III	Trattato
Arrone	3			1	1	1	
Assisi-Capodacqua			13		1	12	
Assisi Beviglie	4				1	3	
Assisi Beviglie	1					1	
Foligno Sassovivo			13	4	3	6	
Foligno Sassovivo			13	7	4	2	
Foligno Scandolaro				0	0	0	
Foligno Scandolaro				0	0	0	
Foligno-Vescia							X
Gubbio-Pieve d'Agnano			10	1	7	2	
Gualdo Tadino Palazzo Mancinelli				0	0	0	
Spello-Collepino		5		5			
Spoletto Montepincio							X
Spoletto Montepincio							X

Trevi Mascio		5		1	1	3	
Trevi				0	0	0	
Valfabbrica Castagna Alta		7				7	
Stroncone Vascigliano			20	12	7	1	
Terni San Carlo	3				1	2	

## ZONA DOP – COLLI MARTANI

Comune	Infest. Attiva <5%	Infest. Attiva 5-7 %	Infest. Attiva > 8% =	Uova	Larve I	Larve II III	Trattato
Bevagna Loc. Colcimino	3		1			2	
Bettona – Sambro			18	15	3		
Bettona – Montebalacca			26	20	5	1	
Castel Ritaldi Tevernano	1				1		
Castel Ritaldi Tevernano	1				1		
Castel Ritaldi Tevernano							X
Castel Ritaldi Tevernano							X
Castel Ritaldi S.Lorenzo			12		9	3	
Castel Ritaldi Colle del Marchese							X
Castel Ritaldi Colle del Marchese							X

Collazzone-Canalicchio			13	2	2	9	
Collazzone Assignano				0	0	0	
Deruta Casalina							X
G.Cattaneo Colletifo	4			3		1	
Gualdo Cattaneo Rotolone		7			1	6	
Giano dell'Umbria	3				2	1	
Giano dell'Umbria-Formicaro							X
Massa Martana Loc. Viepri vecchio	2			2			
Montefalco Monteimperiale	3			3			
Montefalco San Marco			11	6	2	3	
Montefalco San Marco			11	11			
Montefalco San Marco	3					3	
Montefalco San Marco		7		3	3	1	
Torgiano				0	0	0	
Torgiano	2					2	

## ZONA DOP – COLLI ORVIETANI

Comune	Infest. Attiva <5%	Infest. Attiva 5-7 %	Infest. Attiva > 8% =	Uova	Larve I	Larve II III	Trattato
Montecastello di Vibio			13	2	7	4	

## ZONA DOP – COLLI TRASIMENO

Comune	Infest. Attiva <5%	Infest. Attiva 5-7 %	Infest. Attiva > 8% =	Uova	Larve I	Larve II III	Trattato
Castiglione del lago Poderaccio	4			1	2	1	
Castiglione del lago Fornace			12	6	4	2	
Corciano Castelviato							X
Magione S. Arcangelo		7		1	3	3	
Magione S. Arcangelo	4				4		
Magione Monte del lago	4			3		1	
Magione Monte del lago			8	7		1	
Magione Monte del lago	4			2	1	1	
Magione Andria				0	0	0	
Magione S. Arcangelo	5			1	2	2	

Panicale Montalera	3			2		1	
Panicale Montalera				0	0	0	
Panicale	2				1	1	
Panicale	1				1		
Panicale Fontallaggio		5		1	4		
Panicale Gioveto		6		1	4	1	
Panicale Gioveto		6		1	2	3	
Panicale Gioveto		5		1	4		
Panicale Loc. Cerreto	4			1	1	2	
Panicale Loc. Casalini	4			1	2	1	
Passignano sul Trasimeno			13		11	2	
Passignano sul Trasimeno Campagna			17		15	2	
Passignano sul Trasimeno S.Donato	4			2	2		
Passignano sul Trasimeno S. Donato			18		16	2	
Passignano sul Trasimeno Colpiccione							X
Perugia S.Girolamo	2					2	
Perugia Monteluca			8	5		3	

Perugia Loc. La bruna			18		5	13	
Perugia Montelabate	2					2	
Perugia Pilonocopaterno							X
Perugia Rancolfo			9	1	7	1	
Perugia Rancolfo	2					2	
Piegara Pietroso							
Tuoro Trasimeno Sanguinetto		5			4	1	
Tuoro Trasimeno Montecchio							X
Umbertide Pian d'Assino				0	0	0	
Umbertide Molino Vitelli			13		4	9	
Umbertide Migianella	4				2	2	
Umbertide Colle del Sole	1				1		
Umbertide Civitella Ranieri			11		8	3	

### **Campionamenti effettuati dal 02/09 al 07/9/2016**

Per maggiori dettagli rivolgersi alle Organizzazioni APROL, ASSOPROL e OPOO. Il presente bollettino relativo alla difesa dell' olivo è reperibile al seguente indirizzo :

[www.regione.umbria.it/agricoltura/difesa-integrata](http://www.regione.umbria.it/agricoltura/difesa-integrata)  
nella sezione documenti

Gli interventi fitosanitari, relativamente alla lotta curativa, potranno essere effettuati al superamento della soglia di intervento con le s.a. previste nel disciplinare 2015 -2016 consultabile al seguente indirizzo internet:

[www.regione.umbria.it/agricoltura/difesa-integrata](http://www.regione.umbria.it/agricoltura/difesa-integrata)  
nella sezione normative

In particolare sono previsti interventi con le seguenti s.a.:

- -Fosmet ( al massimo 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità)
- -Imidacloprid (al massimo 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità)
- -Dimetoato ( al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità).

Complessivamente potranno essere effettuati nei confronti della mosca dell'olivo al massimo 2 interventi con le s.a. sopra indicate ( D.D.Regione Umbria N. 6648 del 20.07.2016) salvo deroghe, nel caso si rendessero necessari ulteriori interventi, concesse da questo Servizio.

Tempo stabile nei prossimi giorni

Laddove l'infestazione risulti ridotta (1% – 2%) si consiglia di intervenire quanto prima con esche adulticide contenenti spinosad, per ridurre la presenza degli adulti di mosca.

Previste possibili piogge a partire dall' inizio della prossima settimana

### **Occhio di pavone**

In zone recettive e per cultivars suscettibili ( moraiolo, frantoio, nostrale di rigali ecc...) si consiglia un (1) intervento con prodotti rameici ( al massimo 6/kg di s.a./ha annui).

E' possibile scaricare l'APP – AGRICOLUS e ricevere, registrandosi, direttamente le informazioni.

Il prossimo bollettino sarà pubblicato il 15 settembre

**Gli Ispettori fitosanitari**

Dr.ssa E. Consolani 

Dott. G Natalini 

Il Dirigente vicario

Servizio Innovazione, Promozione, Irrigazione, Zootecnia e Fitosanitario

Dott. For. Francesco Grohmann

