Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI

Servizio Politiche per l'innovazione, la promozione e fitosanitarie

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 2975 DEL 08/05/2015

OGGETTO: Disciplinare di produzione integrata della Regione Umbria. Sezione “Difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti. Annualità 2014-2015.” Aggiornamento , deroga territoriale fusariosi e ruggine gialla del frumento, deroga utilizzo s.a. clomazone in pre-trapianto su tabacco.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
Vista la DGR 1689 del 15/12/14 con cui tra l’altro viene nominato dirigente del Servizio Fitosanitario Regionale il dr. Giuliano Polenzani;
Preso atto che con Determina Dirigenziale N. 2027 del 03.04.2015 è stato approvato il Disciplinare di produzione integrata della Regione Umbria. Sezione “Difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti. Annualità 2014-2015.” che, al Capitolo “Indicazioni e norme generali”, al paragrafo 10) “Deroghe alle norme dei disciplinari di agricoltura integrata” prevede la possibilità di concessione, da parte del Servizio Politiche per le Innovazioni e Fitosanitarie, di deroghe alle limitazioni di impiego di fitofarmaci nella lotta alle patologie delle colture;
Viste le richieste di sopralluogo per accertare l’entità degli attacchi di fitopatie su frumento pervenute dalle seguenti Ditte:

Società agricole appartenenti al Gruppo agroalimentare Farchioni in data 24.04.2015 :
- Farchioni Cecilia Az. Agraria
- Società Agricola Mastri Birrai Umbri s.s.
-Soc. Agricola Fonte Cupa s.s
-Soc. Agr. La Pescara di Spazzoni Giuseppe e Az. Agr. Spazzoni Vittorio in data 30.04.2015 (N. Prot. 0064398 del 05.05.2015);
-Az. Minelli Giuseppe Gualdo Tadino (PG) Fraz. Rasina;
-Azienda agraria Vaiano di Piero Cesarini Loc. Bolognami-Porto Castiglione del lago (PG) (N. Prot.0064287 del 05.05.2015);

Preso atto che in data 30.04.2015 l' Ispettore fitosanitario Dr Giovanni Natalini ha effettuato un sopralluogo presso la maggior parte delle aziende constatando la presenza di attacchi diffusi di ruggine gialla su frumento tenero e duro ;

Preso atto altresì che estesi focolai di ruggine gialla sono stati rinvenuti sul territorio regionale;

Tenuto conto del recente e particolare andamento climatico che ha fortemente condizionato la coltura del frumento sia duro che tenero dal punto di vista agronomico e fitosanitario;

Ritenuto opportuno intervenire nei confronti della ruggine gialla su tutto il territorio regionale, impiegando le sostanze attive (s. a.) indicate nelle relative linee guida nazionali 2014/2015, secondo le indicazioni riportate nelle seguenti tabelle:

Coltura	s.a.	Avversità	Note e limitazioni
Frumento duro e tenero	Azoxystrobin Picoxystrobin Pyraclostrobin Propiconazolo Tetraconazolo Tebuconazolo Triadimenol Flutriafol (Ciproconazolo+Procloraz) (Tryfloxistrobin+Cyproconazolo) (Difenoconazolo+Tebuconazolo)	Ruggine gialla *Puccinia striiformis*	**Soglia vincolante di intervento:** Comparsa uredosori sulle ultime due foglie. Possibile una miscela tra le s.a. indicate. **Indipendentemente dall' avversità al massimo 2 interventi anticrittogamici all' anno**

Rilevato che si reputa opportuno intervenire in via cautelativa, ad inizio fioritura, nei confronti della fusariosi della spiga del frumento, sia duro che tenero, su tutto il territorio regionale in considerazione dell' andamento climatico, impiegando le s.a. indicate nelle relative linee guida nazionali 2014/2015, secondo le indicazioni riportate in tabella:

Coltura	s.a.	Avversità	Note e limitazioni
Frumento duro e tenero	Tebuconazolo Procloraz Propiconazolo (Ciproconazolo+Procloraz) Pyraclostrobin (Difenoconazolo+Tebuconazolo)	Fusariosi della spiga	Interventi da effettuarsi ad inizio fioritura. Possibile una miscela tra le s.a. indicate. Indipendentemente dall' avversità al massimo 2 interventi anticrittogamici all' anno

Atteso che in data 16.04.2015 il MIPAAF ha trasmesso (N. Prot. 0054470) l'aggiornamento delle linee guida nazionali di produzione integrata e la bozza di verbale "GDI-seduta del 25.03.2015" come riportato nella tabella seguente:

s.a.	Coltura	Avversità	Modifiche
Bicarbonato di K	Pero	Psylla	Inserimento
Propamocarb	Cavolo rapa da seme	Varie	Esclusione da solo, rimane in miscela con Fosetyl Al
Metalaxyl	Pisello	Peronospora	Al massimo 2 interventi all'anno
(Difenoconazolo + Tebuconazolo)	Frumento	Septoria, Fusariosi, Oidio e Ruggine	Nei limiti previsti per l'impiego dei fungicidi sulla coltura
Acetamiprid	Melo e Pero	Mosca (*C. capitata*)	Nei limiti previsti sulla coltura per i neonicotinoidi
Acetamiprid	Ciliegio	*Drosophila suzukii*,	Nei limiti previsti sulla coltura per i neonicotinoidi
Acetamiprid	Vite	Cocciniglie (*Planococcus* sp.)	Nei limiti previsti sulla coltura per i neonicotinoidi
Acetamiprid	Vite	Cicadellidi (*Empoasca* sp., *Z. rhamni*, *Scafoideus titanus*)	Nei limiti previsti sulla coltura per i neonicotinoidi
Acetamiprid	Piselli	Afidi	Nei limiti previsti sulla coltura per i neonicotinoidi,
Acetamiprid	Cece	Afidi	Nei limiti previsti sulla coltura per i neonicotinoidi
Acetamiprid	Cicerchia	Afidi	Nei limiti previsti sulla coltura per i neonicotinoidi
Acetamiprid	Colza	Ceutorrinco	Nei limiti previsti sulla coltura per i neonicotinoidi
Acetamiprid	Tabacco	Pulce (*Epitrix* sp.)	Nei limiti previsti sulla coltura per i neonicotinoidi
(Tebuconazolo + Fluopyram)	Melo	Ticchiolatura e Oidio	Con i limiti degli SDHI(al max 4) e degli IBE (Al max 4), al massimo 2 interventi all'anno
(Tebuconazolo + Fluopyram)	Pero	Ticchiolatura e Maculatura	Con i limiti degli SDHI(Al max 4) e degli IBE(Al max 4), al massimo 2 interventi all'anno
(Tebuconazolo + Fluopyram)	Pesco	Oidio e Monilia	Con i limiti degli SDHI (Al max 4) e degli IBE (Al max 4), al massimo 2 interventi all'anno
(Tebuconazolo + Fluopyram)	Albicocco	Oidio e Monilia	Con i limiti degli SDHI (Al max 4) e degli IBE(Al max 3), al massimo 2 interventi all'anno
(Tebuconazolo + Fluopyram)	Ciliegio	Monilia	Con i limiti degli SDHI(Al max 4) e degli IBE(Al max 2), al massimo 2 interventi all'anno

(Tebuconazolo + Fluopyram)	Vite da vino	Oidio	Con i limiti degli SDHI (tra boscalid e fluopyram al max 1 intervento indipendentemente dall'avversità)) e degli IBE (Al max 3)
Metiram	Cipolla	Peronospora	Inserire , in alternativa e nel limite di eventuali altri ditiocarbammati e portare il limite degli interventi a 3 all'anno
Metiram	Anguria	Peronospora	Inserire, in alternativa e nel limite di eventuali altri ditiocarbammati e portare il limite degli interventi a 3 all'anno
Metiram	Melone	Peronospora	Inserire , in alternativa e nel limite di eventuali altri ditiocarbammati e portare il limite degli interventi a 3 all'anno
Metiram	Cetriolo	Peronospora	Inserire , in alternativa e nel limite di eventuali altri ditiocarbammati e portare il limite degli interventi a 3 all'anno
Metiram	Zucchino	Peronospora	Inserire , in alternativa e nel limite di eventuali altri ditiocarbammati e portare il limite degli interventi a 3 all'anno
Pirimicarb	sedano, tabacco	Afidi	Escludere
Pyriproxifen	vite	cocciniglie	Inserire
Pyriproxifen	pesco anche post fioritura	cocciniglie	Inserire

Preso atto che in data 06.05.2015 L'Organizzazione Produttori Italiani Tabacco SCA (OPIT) con sede in via Settevalli, 131/F-06929 Perugia ha richiesto la deroga per l'utilizzo del clomazone in pre-trapianto;
Ritenuta valida la suddetta istanza per il controllo delle infestanti graminacee e dicotiledoni su tabacco alle dosi di seguito indicate in associazione alla s. a. pendimetalin: pendimetalin 24,56%, clomazone 4,90% - dose l/ha 2,5-3;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Il Dirigente
D E T E R M I N A

di approvare, per quanto in premessa indicato :
1) di intervenire nei confronti della ruggine gialla su tutto il territorio regionale , impiegando le sostanze attive (s.a.) indicate nelle relative linee guida nazionali 2014/2015, secondo le indicazioni riportate nella seguente tabella:

Coltura	s.a.	Avversità	Note e limitazioni
Frumento duro e tenero	Azoxystrobin Picoxystrobin Pyraclostrobin Propiconazolo Tetraconazolo Tebuconazolo Triadimenol	Ruggine gialla *Puccinia striiformis*	**Soglia vincolante di intervento:** Comparsa uredosori sulle ultime due foglie. Possibile una miscela tra le s.a. indicate. **Indipendentemente dall' avversità al massimo 2 interventi anticrittogamici all' anno**

	Flutriafol (Ciproconazolo+Procloraz) (Tryfloxistrobin+Cyproconazolo) (Difenoconazolo+Tebuconazolo)		

2) di intervenire in via cautelativa, ad inizio fioritura, nei confronti della fusariosi della spiga del frumento, sia duro che tenero, su tutto il territorio regionale in considerazione dell' andamento climatico , impiegando le s.a. indicate nelle relative linee guida nazionali 2014/2015, secondo le indicazioni riportate in tabella:

Coltura	s.a.	Avversità	Note e limitazioni
Frumento duro e tenero	Tebuconazolo Procloraz Propiconazolo (Ciproconazolo+Procloraz) Pyraclostrobin (Difenoconazolo+Tebuconazolo)	Fusariosi della spiga	Interventi da effettuarsi ad inizio fioritura. Possibile una miscela tra le s.a. indicate. Indipendentemente dall' avversità al massimo 2 interventi anticrittogamici all' anno

3) di recepire per le colture interessate l'aggiornamento delle linee guida nazionali di produzione integrata secondo la bozza di verbale "GDI-seduta del 25.03.2015" come riportato nella tabella seguente:

s.a.	**Coltura**	**Avversità**	**Modifiche**
Bicarbonato di K	Pero	Psylla	Inserimento
Propamocarb	Cavolo rapa da seme	Varie	Esclusione da solo, rimane in miscela con Fosetyl Al
Metalaxyl	Pisello	Peronospora	Al massimo 2 interventi all'anno
(Difenoconazolo + Tebuconazolo)	Frumento	Septoria, Fusariosi, Oidio e Ruggine	Nei limiti previsti per l'impiego dei fungicidi sulla coltura
Acetamiprid	Melo e Pero	Mosca (*C. capitata*)	Nei limiti previsti sulla coltura per i neonicotinoidi
Acetamiprid	Ciliegio	*Drosophila suzukii*,	Nei limiti previsti sulla coltura per i neonicotinoidi
Acetamiprid	Vite	Cocciniglie (*Planococcus* sp.)	Nei limiti previsti sulla coltura per i neonicotinoidi
Acetamiprid	Vite	Cicadellidi (*Empoasca* sp., *Z. rhamni*, *Scafoideus titanus)*	Nei limiti previsti sulla coltura per i neonicotinoidi
Acetamiprid	Piselli	Afidi	Nei limiti previsti sulla coltura per i neonicotinoidi,

Acetamiprid	Cece	Afidi	Nei limiti previsti sulla coltura per i neonicotinoidi
Acetamiprid	Cicerchia	Afidi	Nei limiti previsti sulla coltura per i neonicotinoidi
Acetamiprid	Colza	Ceutorrinco	Nei limiti previsti sulla coltura per i neonicotinoidi
Acetamiprid	Tabacco	Pulce (*Epitrix* sp.)	Nei limiti previsti sulla coltura per i neonicotinoidi
(Tebuconazolo + Fluopyram)	Melo	Ticchiolatura e Oidio	Con i limiti degli SDHI(al max 4) e degli IBE (Al max 4), al massimo 2 interventi all'anno
(Tebuconazolo + Fluopyram)	Pero	Ticchiolatura e Maculatura	Con i limiti degli SDHI(Al max 4) e degli IBE(Al max 4), al massimo 2 interventi all'anno
(Tebuconazolo + Fluopyram)	Pesco	Oidio e Monilia	Con i limiti degli SDHI (Al max 4) e degli IBE (Al max 4), al massimo 2 interventi all'anno
(Tebuconazolo + Fluopyram)	Albicocco	Oidio e Monilia	Con i limiti degli SDHI (Al max 4) e degli IBE(Al max 3), al massimo 2 interventi all'anno
(Tebuconazolo + Fluopyram)	Ciliegio	Monilia	Con i limiti degli SDHI(Al max 4) e degli IBE(Al max 2), al massimo 2 interventi all'anno
(Tebuconazolo + Fluopyram)	Vite da vino	Oidio	Con i limiti degli SDHI (tra boscalid e fluopyram al max 1 intervento indipendentemente dall'avversità)) e degli IBE (Al max 3)
Metiram	Cipolla	Peronospora	Inserire , in alternativa e nel limite di eventuali altri ditiocarbammati e portare il limite degli interventi a 3 all'anno
Metiram	Anguria	Peronospora	Inserire, in alternativa e nel limite di eventuali altri ditiocarbammati e portare il limite degli interventi a 3 all'anno
Metiram	Melone	Peronospora	Inserire , in alternativa e nel limite di eventuali altri ditiocarbammati e portare il limite degli interventi a 3 all'anno
Metiram	Cetriolo	Peronospora	Inserire , in alternativa e nel limite di eventuali altri ditiocarbammati e portare il limite degli interventi a 3 all'anno
Metiram	Zucchino	Peronospora	Inserire , in alternativa e nel limite di eventuali altri ditiocarbammati e portare il limite degli interventi a 3 all'anno
Pirimicarb	sedano, tabacco	Afidi	Escludere
Pyriproxifen	vite	cocciniglie	Inserire
Pyriproxifen	pesco anche post fioritura	cocciniglie	Inserire

4) di intervenire per il controllo delle infestanti graminacee e dicotiledoni su tabacco in pre-trapianto con la s.a. clomazone in associazione a pendimetalin alle dosi indicate:

pendimetalin 24,56%, clomazone 4,90% - dose l/ha 2,5-3;
5)di notificare il presente provvedimento alle Ditte che hanno inoltrato richiesta di deroga;
6) di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e sul sito Internet della Regione Umbria nella parte riguardante il Servizio fitosanitario regionale dell' area tematica Agricoltura;
7) di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 07/05/2015

L'Istruttore
Giovanni Natalini
Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 07/05/2015

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Giovanni Natalini
Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 08/05/2015

Il Dirigente
Giuliano Polenzani
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.l.g.s. 7 marzo 2005, n.82, art. 21 comma 2