

DIFESA GUIDATA VITE
BOLLETTINO FITOSANITARIO N.5 DEL 18.05.017- PERUGIA E TERNI

Fase fenologica : Pre-fioritura- Inizio Fioritura

PERONOSPORA

Possibile evasione infezione primaria verificatasi con piogge cadute dal 06 al 08.05 su tutto il territorio regionale.

In previsione di possibili piogge si consiglia di assicurare la copertura antiperonosporica, con prodotti endoterapici quali cymoxanil, CAA (mandipropamide, dimetomorph, valiphenalate, benthiovalicarb, iprovalicarb), Fenilammidi (metalaxil, metalaxil-m, benalaxil, benalaxil-M), Fluopicolide, associati a prodotti di copertura oppure le altre s.a. presenti nel disciplinare di difesa integrata (ametoctradina, amisulbrom, cyazofamide ecc).

OIDIO

Abbinare al trattamento antiperonosporico zolfi bagnabili, meptildinocap, spiroxamina, Bupirimate, IBE ecc....

L' Ispettore fitosanitario
(Dr Agr Giovanni Natalini)

Regione Umbria
Servizio Innovazione, Promozione, Irrigazione, Zootecnia e Fitosanitario

Il Dirigente
Dr Giuliano Polenzani

Bo05\2017