



Regione Umbria

Servizio Fitosanitario Regionale

Bollettino Fitosanitario VITE n. 6 del 31/05/2019

PERUGIA E TERNI

Fase fenologica: Lunghezza germogli superiore ai 10 cm., quarta foglia distesa; Infiorescenze rigonfie, i fiori sono ancora chiusi e raggruppati tra loro. (BBCH 15-BBCH 55).

PERONOSPORA

Segnalazione di presenza di sintomi di peronospora nei seguenti Comuni:

Provincia di Terni: Ficule, Amelia, Baschi, Castel Viscardo, Montegabbione, Orvieto, Narni.

Provincia di Perugia: Collazzone, Cannara, Bevagna, Castiglione del Lago, Città di Castello, Giano dell'Umbria, Magione, Marsciano, Massa Martana, Montefalco, Paciano, Perugia, Torgiano, Tuoro sul Trasimeno.

In considerazione di possibili prolungate bagnature fogliari e di presenza di inoculo del micete si consiglia di assicurare la copertura antiperonosporica con prodotti preferibilmente endoterapici quali CAA (mandipropamide, dimetomorph, valiphenalate, benthiovalicarb, iprovalicarb), acilalanine (metalaxil, metalaxil-m), Fluopicolide, ecc., scelti in funzione della fase fenologica, associati a prodotti di copertura.

OIDIO

Abbinare al trattamento antiperonosporico preferibilmente zolfi bagnabili, meptildinocap, spiroxamina, IBE ecc... in funzione della recettività della zona.

Tutti i bollettini fitosanitari relativi alla difesa della vite sono scaricabili dal sito della Regione Umbria al seguente indirizzo: <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/bollettini-fitosanitari>

I bollettini fitosanitari per la coltura della vite vengono redatti sulla base dei Disciplinari di Difesa Integrata 2017/2018, scaricabili dal sito della Regione Umbria al seguente indirizzo: <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/disciplinari-di-produzione-integrata>