



Regione Umbria

Servizio Fitosanitario Regionale

Bollettino Fitosanitario VITE n. 12 del 16/07/2019

PERUGIA E TERNI

Fase fenologica:

Sviluppo acini, Pre-chiusura grappolo, Chiusura grappolo (BBCH 75- BBCH 76- BBCH 77).

PERONOSPORA

Segnalazione di presenza di sintomi di peronospora (dati provenienti da progetto SMART METEO) nei Comuni indicati nei precedenti Bollettini.

Nell' eventualità di presenza di prolungate bagnature si consiglia di intervenire preferibilmente con prodotti rameici.

OIDIO

Si consiglia di abbinare al trattamento antiperonosporico Zolfi bagnabili, Bupirimate, IBE , Metrafenone, Cyflufenamide, Spiroxamina ecc....assicurando una copertura continua in funzione della persistenza del prodotto fitosanitario precedentemente utilizzato oppure intervenire con zolfo in polvere.

Tignoletta della vite (*Lobesia botrana*)

Fase decrescente del volo della 1 generazione carpoфага a Magione, Montefalco, Tuoro sul Trasimeno, Marsciano, Torgiano, Narni, Baschi, Orvieto. Eventuali interventi da effettuarsi al superamento della soglia riportata nel disciplinare di difesa integrata valido per l'anno in corso.

Botrite

Su cultivars a grappolo compatto ed in zone recettive sono possibili interventi in pre-chiusura grappolo con antibotritici specifici riportati nel relativo disciplinare di produzione integrata.

Le s.a. utilizzabili sono riportate nel relativo disciplinare di difesa integrata della Regione Umbria valido per l'annata 2018-2019 (valido per coloro che aderiscono alle misure agroambientali)

Tutti i bollettini fitosanitari relativi alla difesa della vite sono scaricabili dal sito della Regione Umbria al seguente indirizzo: <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/bollettini-fitosanitari>

I bollettini fitosanitari per la coltura della vite vengono redatti sulla base dei Disciplinari di Difesa Integrata 2018/2019, scaricabili dal sito della Regione Umbria al seguente indirizzo:

<http://www.regione.umbria.it/agricoltura/disciplinari-di-produzione-integrata>