



**Regione Umbria**

## **Servizio Fitosanitario Regionale**

**Bollettino Fitosanitario VITE n. 7 del 10/06/2019**

### **PERUGIA E TERNI**

**Fase fenologica:** Bottoni fiorali separati, Fioritura (BBCH 57- BBCH 64).

#### **PERONOSPORA**

Segnalazione di presenza di sintomi di peronospora (dati provenienti da progetto SMART METEO) nei seguenti Comuni:

Provincia di Terni: Ficulle, Amelia, Baschi, Castelviscardo, Montegabbione, Orvieto, Narni.

Provincia di Perugia: Collazzone, Cannara, Bevagna, Castiglione del Lago, Città di Castello, Giano dell'Umbria, Magione, Marsciano, Massa Martana, Montefalco, Paciano, Perugia, Torgiano, Tuoro sul Trasimeno.

In assenza di copertura antiperonosporica e presenza di prolungate bagnature fogliari si consiglia di intervenire con prodotti preferibilmente endoterapici quali CAA (mandipropamide, dimetomorph, valiphenalate, benthiovalicarb, iprovalicarb), acilalanine (metalaxil, metalaxil-m), Fluopicolide, ecc., scelti in funzione della fase fenologica, associati a prodotti di copertura.

#### **OIDIO**

Abbinare al trattamento antiperonosporico preferibilmente zolfi bagnabili, spiroxamina, IBE ecc... in funzione della recettività della zona.

*Tutti i bollettini fitosanitari relativi alla difesa della vite sono scaricabili dal sito della Regione Umbria al seguente indirizzo: <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/bollettini-fitosanitari>*

*I bollettini fitosanitari per la coltura della vite vengono redatti sulla base dei Disciplinari di Difesa Integrata 2018/2019, scaricabili dal sito della Regione Umbria al seguente indirizzo: <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/disciplinari-di-produzione-integrata>*