

DIFESA GUIDATA VITE  
BOLLETTINO FITOSANITARIO N.5 DEL 18.05.017- PERUGIA E TERNI

**Fase fenologica :** Pre-fioritura- Inizio Fioritura

**PERONOSPORA**

Possibile evasione infezione primaria verificatasi con piogge cadute dal 06 al 08.05 su tutto il territorio regionale.

In previsione di possibili piogge si consiglia di assicurare la copertura antiperonosporica, con prodotti endoterapici quali cymoxanil, CAA ( mandipropamide, dimetomorph, valiphenalate, benthiovalicarb, iprovalicarb) , Fenilammidi ( metalaxil, metalaxil-m. benalaxil, benalaxil-M), Fluopicolide, associati a prodotti di copertura oppure le altre s.a. presenti nel disciplinare di difesa integrata (ametoctadina, amisulbrom, cyazofamide ecc).

**OIDIO**

Abbinare al trattamento antiperonosporico zolfi bagnabili, meptildinocap, spiroxamina, Bupirimate, IBE ecc....

L' Ispettore fitosanitario  
( Dr Agr Giovanni Natalini)

Regione Umbria  
Servizio Innovazione, Promozione, Irrigazione, Zootecnia e Fitosanitario

Il Dirigente  
Dr Giuliano Polenzani



Bo05\2017