



**Regione Umbria**

## **Servizio Fitosanitario Regionale**

**DIFESA GUIDATA VITE  
BOLLETTINO FITOSANITARIO N. 2 DEL 08/05/2018**

**PERUGIA E TERNI**

Fase fenologica:

Grappoli visibili, Grappoli separati (BBCH 53- BBCH55)

### **PERONOSPORA**

Probabile infezione primaria verificatasi intorno al 3-4 maggio.

Non risulta nelle aziende monitorate (Progetto Smart meteo) presenza di sintomi di peronospora eccetto una segnalazione di una presumibile macchia di peronospora nel Comune di Narni non sporificata.

In previsione di possibili piogge si consiglia di assicurare la copertura antiperonosporica con prodotti preferibilmente endoterapici quali CAA (mandipropamide, dimetomorph, valiphenalate, benthiovalicarb, iprovalicarb), Fluopicolide, Acilalanine ( metalaxil-m, Benalaxil-m ecc.), ecc., associati a prodotti di copertura in funzione della fase fenologica più o meno avanzata.

### **OIDIO**

Abbinare al trattamento antiperonosporico preferibilmente zolfi bagnabili, meptildinocap, spiroxamina, Bupirimate, IBE, ecc.

Per coloro che aderiscono alle misure agroambientali della Regione Umbria il disciplinare di difesa integrata per l'anno 2017-2018 è disponibile nel sito della Regione Umbria:

<http://www.regione.umbria.it/agricoltura/disciplinari-di-produzione-integrata>

*Tutti i bollettini fitosanitari relativi alla difesa della vite sono reperibili nel sito della Regione dell'Umbria al seguente indirizzo:*

<http://www.regione.umbria.it/agricoltura/bollettini-fitosanitari>