

DIFESA INTEGRATA FAVA

AVVERSITÀ	CRITERI DA INTERVENTO	S.a. e AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
CRITTOGAME					
Botrite (<i>Botrytis fabae, B. cinerea</i>)	Interventi agronomici: <ul style="list-style-type: none"> • distruggere le piante infette; • adottare ampie rotazioni; • evitare le semine fitte 				
Ascochitosi (<i>Mycosphaerella pinodes</i>)	Interventi agronomici: <ul style="list-style-type: none"> • impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano certificato ai sensi della normativa fitosanitaria vigente; • adottare ampie rotazioni; • distruggere le piante infette • limitare le irrigazioni. 				
Ruggine (<i>Uromyces fabae</i>)	Interventi agronomici: <ul style="list-style-type: none"> • scegliere varietà poco recettive; • distruggere le piante infette; • adottare ampie rotazioni. Interventi chimici: <ul style="list-style-type: none"> • intervenire in presenza di sintomi. 				
VIROSI					
CMV - virus del mosaico del cetriolo BBWV - virus della maculatura clorotica BYMV - virus del mosaico grave BBSV - virus dell'imbrunimento della fava BBTMV - virus del mosaico vero	Interventi agronomici: <ul style="list-style-type: none"> • programmare la coltura lontano da altre suscettibili; • eliminare le erbe infestanti dai bordi degli appezzamenti; • distruggere le piante infette. 				
FITOFAGI					
Afidi (<i>Aphis fabae</i>)	Interventi agronomici: <ul style="list-style-type: none"> • eliminare le piante erbacee spontanee. Interventi chimici: <ul style="list-style-type: none"> • intervenire solo in caso di gravi infestazioni. 	Al massimo 1 intervento all'anno contro questa avversità			
		Piretrine pure			
		Pirimicarb			
		Etofenprox			
		Acetamiprid			

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità

(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità