

DIFESA GUIDATA VITE
BOLLETTINO FITOSANITARIO N.14 DEL 01/09/2016
PERUGIA E TERNI

Fase fenologica : Maturazione, Inizio maturazione

PERONOSPORA

Non sono previsti interventi salvo per impianti giovani in allevamento dove si interverrà in presenza di prolungate bagnature e sintomi di peronospora con prodotti rameici (limite massimo di impiego 6 Kg annui di s.a. ad ha).

OIDIO

Non si consigliano interventi.

Tignoletta vite

Fase decrescente del volo della 2 generazione carpo-faga.

Eventuali interventi potranno essere effettuati al superamento della soglia di intervento pari al 10-15% di grappoli con uova e/o larve con le s.a. riportate nel disciplinare di difesa integrata vite per l'anno 2015-2016 reperibile sul sito della Regione Umbria:

www.regione.umbria.it/agricoltura/difesa-integrata

Per l'eventuale controllo della tignoletta in 2 generazione carpo-faga le s.a. Clorpirifos-metile e Clorpirifos -etile non possono essere impiegate (DD Regione Umbria N. 7313 del 05.08.2016).

Botrite

Su cultivars tardive a grappolo compatto ed in zone recettive sono possibili interventi in pre-raccolta con antibiotritici specifici riportati nel relativo disciplinare di produzione integrata

Drosophila Suzuki


Consigliabile l'installazione di trappole per effettuare il monitoraggio del fitofago su cultivars a buccia sottile .

Regione Umbria

Servizio Innovazione , promozione, Irrigazione, zootecnia e fitosanitario

L' Ispettore fitosanitario(Dr Giovanni Natalini) 

Il Dirigente

(Dr Giuliano Polenzani) 

Bo14\2016