

## AII. A .INTEGRAZIONE ALLE NORME DEL DISCIPLINARE DI DIFESA INTEGRATA 2020-2021 DELLA REGIONE UMBRIA- FINESTRA

COLTURA	AVVERSITA'	SOSTANZA ATTIVA	NOTE E LIMITAZIONI
<b>DIFESA FRUTTICOLE</b>			
Albicocco	Afidi (Myzus persicae)	Beauveria bassiana	
Ciliegio	Monilia	Bicarbonato di potassio	
Ciliegio	Afidi (Myzus cerasi)	Beauveria bassiana	
Pero	Maculatura bruna	Difenoconazolo	Da inserire nei limiti presenti sulla coltura
Pero	Maculatura bruna	Bicarbonato di potassio	
Pero	Cacopsylla pyri	Beauveria bassiana	
Pesco (e nettarino)	Afidi (Myzus persicae)	Beauveria bassiana	
Susino	Monilia	Bicarbonato di potassio	
Susino	Afidi (Myzus persicae)	Beauveria bassiana	
<b>DIFESA PICCOLI FRUTTI</b>			
Piccoli frutti (Ribes, Lampone, Mora, Uva spina)	Cicaline (Metcalfa pruinosa ecc.), Psilla e Cercopidi, Raghetto rosso (Tetranychus urticae ecc.) ed Eriofidi	Olio essenziale di arancio dolce	Da inserire sulle avversità ove presenti
<b>DIFESA FRAGOLA</b>			
Fragola in serra	Oidio	Cos-Oga	
Fragola (in serra e in tunnel)	Tetranychus spp e Phytonemus pallidus	Cyflumetofen	Refuso: non applicabile in pieno campo

<b>DIFESA ORTICOLE SOLANACEE</b>			
Solanacee in campo	Oidio	Cos-Oga	
Melanzana	Tripidi, Mosca bianca	Paecilomyces fumosoroseus	Da inserire solo in serra
Peperone	Nematodi	Azadiractina A	
Peperone	Tripidi, Mosca bianca	Paecilomyces fumosoroseus	Da inserire solo in serra .
Pomodoro	Tripidi	Olio essenziale di arancio dolce	
Pomodoro	Nematodi	Azadiractina A	
Pomodoro	Tripidi, Mosca bianca	Paecilomyces fumosoroseus	Da inserire solo in serra ove presente l'avversità
<b>DIFESA ORTICOLE CUCURBITACEE</b>			
Cucurbitacee in campo	Oidio	Cos-Oga	
Cetriolo	Nematodi	Azadiractina A	
Cetriolo	Tripidi, Mosca bianca	Paecilomyces fumosoroseus	Da inserire solo in serra
Melone	Tripidi, Mosca bianca	Paecilomyces fumosoroseus	Da inserire solo in serra .
Zucca	Mosca bianca	Paecilomyces fumosoroseus	Da inserire solo in serra .
Zucchine	Nematodi	Azadiractina A	
Zucchine	Tripidi, Mosca bianca	Paecilomyces fumosoroseus	Da inserire solo in serra.
<b>DIFESA ORTICOLE VARIE</b>			
Carciofo	Bremia lactucae	Mandipropamide	
Carota	Oidio	Bicarbonato di potassio	
Finocchio	Oidio ed Alternaria	Bicarbonato di potassio	
Sedano	Oidio ed Alternaria	Bicarbonato di potassio	
<b>DIFESA LEGUMINOSE</b>			
Cicerchia	Afidi	Tau-fluvalinate	Da inserire nel limite max di 2 piretroidi sulla coltura
Fagiolino	Tripidi, Mosca bianca	Paecilomyces fumosoroseus	Da inserire solo in serra

Fagiolino	Aphis fabae e Piralide	Tau-fluvalinate	Nei limiti dei piretroidi. Al massimo 2 interventi sulla coltura indipendentemente dall'avversità
Fava	Afidi	Tau-fluvalinate	Da inserire nel limite max di 1 piretroide sulla coltura
Lenticchia	Tripidi	Tau-fluvalinate	Da inserire nel limite max di 2 piretroidi sulla coltura
Pisello	Tripidi	Paecilomyces fumosoroseus	Da inserire solo in serra
Pisello	Tripidi	Tau-fluvalinate	Da inserire nel limite dei piretroidi
<b>DIFESA CAVOLI</b>			
Cavolo rapa (in pieno campo ed in serra)	Ruggine (Albugo candida),	Olio essenziale di arancio dolce	
Cavolo broccolo	Peronospora brassicae	Mandipropamide	
Cavolfiore	Peronospora brassicae	Mandipropamide	
<b>DIFESA ORTICOLE A FOGLIA</b>			
Bietola da foglia	Peronospora effusa/farinosa		Eliminare la forma speciale betae dall'avversità peronospora farinosa.
Erbe fresche (coriandolo, aneto, cumino, angelica)	Oidio ed Alternaria	Bicarbonato di potassio	
<b>DIFESA ERBACEE</b>			
Frumento duro	Septoriosi (Septoria spp.);Ruggini bruna e gialla (P. triticina e P. striiformis)	Mefentrifluconazolo + Pyraclostrobin	Da inserire nel limite degli interventi sulla coltura per IBE e Qoi
Frumento tenero	Septoriosi (Septoria spp.); Ruggini bruna e gialla (P. triticina e P. striiformis)	Mefentrifluconazolo + Pyraclostrobin	Da inserire nel limite degli interventi sulla coltura per IBE e Qoi

Orzo	Maculatura (Pyrenophora teres);	Mefentrifluconazolo + Pyraclostrobin	Da inserire nel limite degli interventi sulla coltura per IBE e Qoi
<b>DISERBO</b>			
Tabacco	Infestanti	Benfluralin	Da eliminare
Lattughe e simili	Infestanti	Benfluralin	Da eliminare sulle colture in serra
Rucola	Infestanti	Benfluralin	Da eliminare sulle colture in serra