



Sviluppo delle foglie - Prima foglia spiegata e staccata dal germoglio.



Sviluppo delle foglie - 3 foglie spiegate.



Sviluppo delle foglie - 4 foglie spiegate.



FASE
FENOLOGICA (BBCH 11-13-17,3)

Stadio principale di crescita 1: Sviluppo delle foglie, 5-8 foglie distese.

Fonte: reterurale, ERSA - Baggiolini

In base ai dati pervenuti dal progetto SMART METEO (<https://www.smartmeteo.it/>), dati del Centro funzionale per la protezione civile e dati osservati da questo Servizio fitosanitario si consiglia:

PERONOSPORA

Probabili infezioni secondarie in previsione di piogge ad inizio prossima settimana.

In assenza di copertura antiperonosporica, si consiglia di intervenire con prodotti preferibilmente endoterapici quali CAA (mandipropamide, dimetomorph, valiphenalate, benthiovalicarb, iprovalicarb), acilalanine (metalaxil-m, benalaxil, benalaxil-m), ecc, scelti in funzione della fase fenologica raggiunta, associati a prodotti di copertura.

OIDIO

Abbinare al trattamento antiperonosporico preferibilmente zolfi bagnabili, meptildinocap, spiroxamina, IBE ecc.

Le s.a. utilizzabili sono riportate nel relativo disciplinare di difesa integrata della Regione Umbria valido per l'annata 2019 -2020 (valido per coloro che aderiscono alle misure agroambientali).

Tutti i bollettini fitosanitari relativi alla difesa della vite sono scaricabili dal sito della Regione Umbria al seguente indirizzo:

<http://www.regione.umbria.it/agricoltura/bollettini-fitosanitari>

I bollettini fitosanitari per la coltura della vite vengono redatti sulla base dei Disciplinari di Difesa Integrata 2019/2020, scaricabili dal sito della Regione Umbria al seguente indirizzo: <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/disciplinari-di-produzione-integrata>