


**Inizio fioritura** - 10% delle caliptré staccate dal ricettacolo.



**Fioritura** - 20-30% dei fiori aperti.

## **FASE FENOLOGICA**

**Bottoni fiorali separati (BBCH 57);**  
**Inizio fioritura (BBCH 61) ;**  
**Fioritura-20-30% dei fiori aperti (BBCH 62-63).**

*(Fonte: reterurale, ERSA – Baggiolini)*

**Previsioni meteo: Probabili piogge nel fine settimana a partire da sabato. Tempo in peggioramento ad inizio prossima settimana.**

## **PERONOSPORA**

Presenza di sporadiche macchie di peronospora nella zona di Narni, Calvi, Baschi, Orvieto, Bettona.

In considerazione della delicata fase fenologica e prevista instabilità climatica si consiglia di assicurare la protezione antiperonosporica con prodotti preferibilmente endoterapici quali CAA (mandipropamide, dimetomorph, valiphenalate, benthiovalicarb, iprovalicarb, acilalanine, metalaxil-m, benalaxil, benalaxil-m, ecc..., scelti in funzione della fase fenologica raggiunta, associati a prodotti di copertura.

## **OIDIO**

In assenza di copertura antioidica abbinare al trattamento antiperonosporico preferibilmente spiroxamina, IBE, ecc.

Le s.a. utilizzabili sono riportate nel relativo disciplinare di difesa integrata della Regione Umbria valido per l'annata 2020 -2021 (valido per coloro che aderiscono alle misure agroambientali).

Tutti i bollettini fitosanitari relativi alla difesa della vite sono scaricabili dal sito della Regione Umbria al seguente indirizzo: <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/bollettini-fitosanitari>

I bollettini fitosanitari per la coltura della vite vengono redatti sulla base dei Disciplinari di Difesa Integrata 2020/2021, scaricabili dal sito della Regione Umbria al seguente indirizzo: <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/disciplinari-di-produzione-integrata>