



**Allegagione** - Gli ovari iniziano ad ingrossarsi dopo la fecondazione. Gli stami appassiscono ma restano spesso attaccati al loro punto d'attacco.



**Sviluppo degli acini** - Acini delle dimensioni di un grano di pepe. I grappoli iniziano a piegarsi verso il basso.

## **FASE FENOLOGICA**

**Allegagione (BBCH 71);  
Sviluppo degli acini (BBCH 73)**

*(Fonte: reterurale, ERSA – Baggiolini)*

**Previsioni meteo: Oggi prevista residua instabilità pomeridiana nella zona orientale. Tempo in miglioramento.**

## **PERONOSPORA**

Presenza di sporadiche macchie di peronospora nella zona di Narni, Calvi, Baschi, Orvieto, Bettona.

In presenza di eventuali prolungate bagnature intervenire preferibilmente con ametoctradina, amisulbrom, ecc. privilegiando il rame.

## **OIDIO**

In assenza di copertura antioidica intervenire con IBE, Metrafenone, Cyflufenamide, zolfi bagnabili ecc, oppure zolfo in polvere.

## **TIGNOLETTA DELLA VITE**

Iniziali catture prima generazione carpofaga.

Le s.a. utilizzabili sono riportate nel relativo disciplinare di difesa integrata della Regione Umbria valido per l'annata 2020 -2021 (valido per coloro che aderiscono alle misure agroambientali).

Tutti i bollettini fitosanitari relativi alla difesa della vite sono scaricabili dal sito della Regione Umbria al seguente indirizzo: <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/bollettini-fitosanitari>

I bollettini fitosanitari per la coltura della vite vengono redatti sulla base dei Disciplinari di Difesa Integrata 2020/2021, scaricabili dal sito della Regione Umbria al seguente indirizzo: <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/disciplinari-di-produzione-integrata>