



Sviluppo degli acini - Gli acini raggiungono il 50% della loro dimensione finale o le dimensioni di un piccolo pisello.

75

Chiusura del grappolo - Gli acini hanno raggiunto circa il 70% della loro dimensione finale e cominciano a toccarsi. A seconda delle varietà la chiusura è più o meno lenta e in alcuni casi incompleta.

77

FASE FENOLOGICA

Sviluppo degli acini (BBCH 75)
Chiusura del grappolo (BBCH 77)

(Fonte: *reterurale, ERSA – Baggiolini*)

Previsioni meteo: possibile instabilità climatica nel fine settimana. Tempo in miglioramento ad inizio settimana con temperature in rialzo.

PERONOSPORA

Presenza di sporadici sintomi di peronospora sul territorio regionale su foglia e su grappolo. Si consiglia di intervenire con prodotti preferibilmente rameici.

OIDIO

In assenza di copertura antioidica intervenire preferibilmente con Zolfi bagnabili.

BOTRITE

Su cultivar precoci a grappolo compatto ed in zone recettive sono possibili interventi in pre-chiusura grappolo con antibotritici specifici riportati nel relativo disciplinare di produzione integrata

TIGNOLETTA DELLA VITE

Fase decrescente del volo della 1° generazione carpfaga. Eventuali interventi al superamento della soglia di intervento pari al 10-15% di grappoli con uova e/o larve.

Le s.a. utilizzabili sono riportate nel relativo disciplinare di difesa integrata della Regione Umbria valido per l'annata 2020 -2021 (valido per coloro che aderiscono alle misure agroambientali).

Tutti i bollettini fitosanitari relativi alla difesa della vite sono scaricabili dal sito della Regione Umbria al seguente indirizzo: <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/bollettini-fitosanitari>

I bollettini fitosanitari per la coltura della vite vengono redatti sulla base dei Disciplinari di Difesa Integrata 2020/2021, scaricabili dal sito della Regione Umbria al seguente indirizzo: <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/disciplinari-di-produzione-integrata>