



Sviluppo degli acini - Acini delle dimensioni di un grano di pepe. I grappoli iniziano a piegarsi verso il basso.

73

FASE FENOLOGICA

Sviluppo degli acini (BBCH 73)

(Fonte: *reterurale*, ERSA – Baggiolini)

Previsioni meteo: Tempo stabile.

PERONOSPORA

Presenza di sporadiche macchie di peronospora nella zona di Narni, Calvi, Baschi, Orvieto, Bettona.

In presenza di eventuali prolungate bagnature intervenire preferibilmente con ametoctradina, amisulbrom, ecc. privilegiando il rame

OIDIO

In assenza di copertura antioidica intervenire con IBE, Metrafenone, Cyflufenamide, Zolfi bagnabili ecc., oppure zolfo in polvere.

TIGNOLETTA DELLA VITE

Fase crescente del volo della 1° generazione carpofoaga. Eventuali interventi al superamento della soglia di intervento pari al 10-15% di grappoli con uova e/o larve.

Le s.a. utilizzabili sono riportate nel relativo disciplinare di difesa integrata della Regione Umbria valido per l'annata 2020 -2021 (valido per coloro che aderiscono alle misure agroambientali).

Tutti i bollettini fitosanitari relativi alla difesa della vite sono scaricabili dal sito della Regione Umbria al seguente indirizzo: <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/bollettini-fitosanitari>

I bollettini fitosanitari per la coltura della vite vengono redatti sulla base dei Disciplinari di Difesa Integrata 2020/2021, scaricabili dal sito della Regione Umbria al seguente indirizzo: <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/disciplinari-di-produzione-integrata>