



(Fonte: Servizio fitosanitario regionale)

FASE FENOLOGICA

Chiusura grappoli (BBCH 77)
Invaiaitura (BBCH 81)

Tendenza: Isolati rovesci al primo mattino sui versanti orientali della dorsale appenninica, in rapido esaurimento. Per il resto della giornata poco nuvoloso su tutta la regione, in ulteriore miglioramento del pomeriggio. <http://www.cfumbria.it/index.php?s=29>

In base ai dati pervenuti in questa settimana dalla rete di monitoraggio regionale sugli areali TRASIMENO, PERUGINO-TORGIANO, ALTO TEVERE, MONTEFALCO, ORVIETO-NARNI, si rappresenta la seguente situazione:

PERONOSPORA

Assenza o lievi sintomi nelle aziende monitorate. In assenza di copertura antiperonosporica si consiglia di intervenire dove si sono verificate prolungate bagnature con prodotti preferibilmente rameici associati a citotropici dove presenti sintomi.

OIDIO

Situazione di medio- basso rischio in base ai dati dei modelli previsionali. In assenza di copertura antioidica intervenire con IBE, Metrafenone, Cyflufenamide, Zolfi bagnabili ecc. oppure zolfo in polvere.

TIGNOLETTA

Fase terminale del volo della 1 generazione carpofaga. Eventuali interventi al superamento della soglia di intervento pari al 10-15% di grappoli con uova e/o larve

Le s.a. utilizzabili sono riportate nel relativo disciplinare di difesa integrata della Regione Umbria valido per l'annata 2021 -2022 (valido per coloro che aderiscono alle misure agroambientali). <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/disciplinari-di-produzione-integrata>

Tutti i bollettini fitosanitari relativi alla difesa della vite sono scaricabili dal sito della Regione Umbria al seguente indirizzo: [http://www.regione.umbria.it/agricoltura/bollettini fitosanitari](http://www.regione.umbria.it/agricoltura/bollettini-fitosanitari)