



(Fonte: Servizio fitosanitario regionale)

FASE FENOLOGICA

Invaiatura (BBCH 81-83)

Tendenza: sereno o poco nuvoloso con temperature in graduale nuovo aumento. <http://www.cfumbria.it/index.php?s=29>

In base ai dati pervenuti in questa settimana dalla rete di monitoraggio regionale sugli areali TRASIMENO, PERUGINO-TORGIANO, ALTO TEVERE, MONTEFALCO, ORVIETO-NARNI, si rappresenta la seguente situazione:

PERONOSPORA

Non si consigliano interventi

OIDIO

Situazione di basso rischio in base ai dati dei modelli previsionali. In presenza di eventuali iniziali sintomi intervenire con zolfi bagnabili, etc., oppure zolfo in polvere

TIGNOLETTA

Inizio volo 2° generazione carpo-faga in alcune zone. Eventuali interventi al superamento della soglia di intervento pari al 10-15% di grappoli con uova e/o larve

Le s.a. utilizzabili sono riportate nel relativo disciplinare di difesa integrata della Regione Umbria valido per l'annata 2021 -2022 (valido per coloro che aderiscono alle misure agroambientali). <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/disciplinari-di-produzione-integrata>

Tutti i bollettini fitosanitari relativi alla difesa della vite sono scaricabili dal sito della Regione Umbria al seguente indirizzo: <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/bollettini-fitosanitari>