


**FASE
FENOLOGICA (BBCH 53)**

da Prima foglia distesa a Quinta foglia distesa



(Fonte: reterurale, ERSA, Baggiolini, Servizio fitosanitario regionale)

Previsioni meteo: Tempo incerto a inizio settimana.

<http://www.cfumbria.it/index.php?s=29>

In base ai dati pervenuti dalla rete di monitoraggio regionale sugli areali TRASIMENO, PERUGINO-TORGIANO, ALTO TEVERE, MONTEFALCO, ORVIETO, si rappresenta la seguente situazione:

PERONOSPORA

Si consiglia di intervenire dove i germogli sono superiori a 10 cm con prodotti preferibilmente endoterapici quali CAA (Dimetomorf, Mandipropamide, Valiphenalate, Benthiovalicarb, Iprovalicarb, Cymoxanil abbinati a prodotti di copertura.

OIDIO

Abbinare al trattamento antiperonosporico Spiroxamina, Meptildinocap, Zolfi bagnabili.

Le s.a. utilizzabili sono riportate nel relativo disciplinare di difesa integrata della Regione Umbria valido per l'annata 2021 -2022 (valido per coloro che aderiscono alle misure agroambientali). <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/disciplinari-di-produzione-integrata>

Tutti i bollettini fitosanitari relativi alla difesa della vite sono scaricabili dal sito della Regione Umbria al seguente indirizzo: <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/bollettini-fitosanitari>