



(Fonte: Servizio fitosanitario regionale)

FASE FENOLOGICA

Fine Fioritura (BBCH 69);
Allegagione (BBCH 71);
Sviluppo acini (BBCH 73-75)

Tendenza: Da domenica tempo prevalentemente stabile. <http://www.cfumbria.it/index.php?s=29>

In base ai dati pervenuti dalla rete di monitoraggio regionale sugli areali TRASIMENO, PERUGINO-TORGIANO, ALTO TEVERE, MONTEFALCO, ORVIETO-NARNI, si rappresenta la seguente situazione:

PERONOSPORA

Assenza di sintomi nelle aziende monitorate. In assenza di copertura antiperonosporica si consiglia di intervenire con prodotti preferibilmente rameici per scongiurare possibili infezioni secondarie.

OIDIO

Assenza di sintomi nelle aziende monitorate. Situazione di alto rischio in base ai dati dei modelli previsionali.

In assenza di copertura antioidica abbinare al trattamento antiperonosporico IBE, Metrafenone, Cyflufenamide, Zolfi bagnabili etc.

Le s.a. utilizzabili sono riportate nel relativo disciplinare di difesa integrata della Regione Umbria valido per l'annata 2021 -2022 (valido per coloro che aderiscono alle misure agroambientali). <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/disciplinari-di-produzione-integrata>

Tutti i bollettini fitosanitari relativi alla difesa della vite sono scaricabili dal sito della Regione Umbria al seguente indirizzo: [http://www.regione.umbria.it/agricoltura/bollettini fitosanitari](http://www.regione.umbria.it/agricoltura/bollettini-fitosanitari)