



FASE FENOLOGICA:
da Quinta foglia distesa (BBCH 15) a
Nona foglia distesa (BBCH 19)
(Fonte: SFR)

Tendenza: Si prevedono giornate all'insegna dell'instabilità pomeridiana tipicamente estiva con brevi ed isolati rovesci o temporali. <https://cfumbria.regione.umbria.it/previsioni-meteo>

In base ai dati pervenuti dalla rete di monitoraggio regionale sugli areali MEDIA VALLE DEL TEVERE, ORVIETANO E VALLE UMBRA SUD, si rappresenta la seguente situazione:

PERONOSPORA

Presenza di sintomi sul territorio regionale. In considerazione dell'instabilità climatica si consiglia di assicurare la copertura antiperonosporica, con prodotti preferibilmente endoterapici quali CAA (Dimetomorf, Mandipropamide, Valiphenalate, Benthiovalicarb, Iprovalicarb) , Metalaxil-M, Fluopicolide, ecc.. abbinati a prodotti di copertura.

OIDIO

Abbinare al trattamento antiperonosporico Spiroxamina, Zolfi bagnabili , IBE ecc.

Per coloro che aderiscono alle misure agroambientali della Regione Umbria, sono da tenere in considerazione le soglie di intervento previste per le specifiche avversità riportate nel relativo disciplinare di difesa integrata 2022/2023, scaricabile dal sito della Regione Umbria al seguente indirizzo: <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/disciplinari-di-produzione-integrata>

Tutti i bollettini fitosanitari relativi alla difesa della vite sono scaricabili dal sito della Regione Umbria al seguente indirizzo: <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/bollettini-fitosanitari>