

BOLLETTINO FITOSANITARIO Della VITE


N.5 del 09/05/2025

valido per le province di Perugia e Terni



FOCUS SETTIMANALE

Il modello previsionale in dotazione al Servizio Fitosanitario segnala un Potenziale infettivo leggero, si consiglia comunque di assicurare la copertura antiperonosporica.



Le indicazioni date con il Bollettino fitosanitario, consentono agli operatori di attuare la difesa integrata obbligatoria ai sensi del art. 19 D.Lgs 150/12 sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Vengono riportate informazioni sull'andamento meteorologico, sulla fase fenologica, situazione epidemiologica delle principali avversità, indicazioni sul momento più opportuno in cui effettuare eventuali trattamenti ed eventuali raccomandazioni sui prodotti fitosanitari utilizzabili, nonché orientamenti operativi relativamente all'adozione dei principi generali di difesa integrata (All. III DLgs 150/12).


Le indicazioni forniscono importanti elementi per la corretta attuazione della difesa integrata volontaria (es: certificazione nell'ambito di sistemi di qualità SQNPI – Sistema Qualità Nazionale Produzione Integrata). In tal caso le indicazioni sono coerenti con le “Norme tecniche per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti” del Disciplinare di Produzione Integrata (DPI) della Regione Umbria (<https://www.regione.umbria.it/agricoltura/disciplinari-di-produzione-integrata>).

Il PAN prevede che per il controllo delle diverse avversità delle colture sia possibile l'utilizzo dei fitofarmaci. Questa possibilità è però condizionata al rispetto preventivo di alcune misure ed in particolare specifica che questi prodotti possano essere impiegati solo all'interno di strategie di difesa integrata (obbligatoria o volontaria) o di difesa biologica. Uno dei punti fondamentali della difesa integrata è la possibilità per l'operatore professionale di utilizzare i prodotti fitosanitari solo quando necessario e cioè quando ci sono le condizioni per lo sviluppo dell'avversità e nel rispetto rigoroso delle indicazioni riportate in etichetta.

BOLLETTINO FITOSANITARIO Della VITE

N.5 del 09/05/2025


valido per le province di Perugia e Terni




SFR
Umbria
Servizio
Fitosanitario
Regionale

ANDAMENTO METEOROLOGICO

Tendenza: Maltempo ad inizio della prossima settimana con la possibilità di temporali sparsi, localmente intensi. <https://cfumbria.regione.umbria.it/previsioni-meteo>




Il grafico riporta temperature, precipitazioni, bagnatura fogliare e umidità relativa registrate negli ultimi 7 giorni, dalla stazione meteorologica dell'areale Media Valle del Tevere



Il grafico riporta temperature, precipitazioni, bagnatura fogliare e umidità relativa registrate negli ultimi 7 giorni, dalla stazione meteorologica dell'areale dell'orvietano

BOLLETTINO FITOSANITARIO Della VITE

N.5 del 09/05/2025
valido per le province di Perugia e Terni



Il grafico riporta temperature, precipitazioni, bagnatura fogliare e umidità relativa registrate negli ultimi 7 giorni, dalla stazione meteorologica dell'areale Valle umbra sud

FASE FENOLOGICA

La fase fenologica varia da Sviluppo delle foglie - Due foglie spiegate (BBCH 12) a Grappoli separati (BBCH 55) - Bottoni fiorali separati (BBCH 57).



BOLLETTINO FITOSANITARIO Della VITE

N.5 del 09/05/2025
valido per le province di Perugia e Terni



MONITORAGGIO PATOGENI

PERONOSPORA

Segnalazioni di sporadiche macchie d'olio nei Comuni di Narni, Sangemini (TR), Montefalco e Torgiano (PG).

Stante l'incerto andamento climatico si consiglia di assicurare la copertura antiperonosporica, dove i germogli hanno raggiunto o superato i 10 cm.


STRATEGIE DI DIFESA

Intervenire con prodotti endoterapici quali CAA (Mandipropamide, Valiphenalate, Iprovalicarb), Fenilammidi (Benalaxil-M, Metalaxil, Metalaxil-M), Fluopicolide ecc... abbinati a prodotti di copertura.

Livello di rischio segnalato dal modello previsionale

Il modello previsionale in dotazione al Servizio Fitosanitario Regionale, segnala un **Potenziale infettivo leggero** in funzione della fase fenologica e dell'andamento meteorologico, in tutti gli areali monitorati.

È comunque opportuno assicurare la copertura antiperonosporica.



Per coloro che aderiscono alle Misure Agroambientali della Regione Umbria, sono da tenere in considerazione le soglie di intervento previste per le specifiche avversità riportate nel relativo Disciplinare di produzione integrata 2024/2025, al seguente indirizzo: <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/disciplinari-di-produzione-integrata>
Tutti i bollettini fitosanitari relativi alla difesa della vite sono scaricabili dal sito della Regione Umbria al seguente indirizzo: <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/bollettini-fitosanitari>

**BOLLETTINO FITOSANITARIO
Della VITE**

N.5 del 09/05/2025
valido per le province di Perugia e Terni



MONITORAGGIO PATOGENI

OIDIO

STRATEGIE DI DIFESA

Abbinare al trattamento
antiperonosporico
Spiroxamina,
Meptildinocap,
Zolfi bagnabili, IBE ecc...

UTILIZZO DEL RAME

Si ricorda che il decreto 2018/1991 stabilisce in 28 kg di Rame nell'arco di 7 anni (in media 4 kg per anno). L'utilizzo di concimi contenenti rame si deve limitare ai casi in cui sussista la presenza di una dimostrata necessità tecnica che, nella fattispecie, deve consistere in una documentata carenza nutrizionale della coltura oggetto di concimazione per il micronutriente "Rame".

Per coloro che aderiscono alle Misure Agroambientali della Regione Umbria, sono da tenere in considerazione le soglie di intervento previste per le specifiche avversità riportate nel relativo Disciplinare di produzione integrata 2024/2025, al seguente indirizzo: <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/disciplinari-di-produzione-integrata>
Tutti i bollettini fitosanitari relativi alla difesa della vite sono scaricabili dal sito della Regione Umbria al seguente indirizzo: <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/bollettini-fitosanitari>